

# Så använder du Airomir® Inhalationsspray



Denna patientinformation har du fått av din läkare/sjuksköterska

## Varför Airomir Inhalationsspray?

Det här läkemedlet har ordinerats av din läkare, det används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Det är viktigt att du följer de instruktioner och den dos som din läkare ordinerat även om du känner dig bättre. Hör av dig till din läkare eller sjuksköterska om du har frågor. Läs bipacksedeln i förpackningen eller på [www.fass.se](http://www.fass.se).

## Rengör din inhalationsspray

Skölj den blå plastbehållaren minst en gång i veckan för att förebygga att behållaren täpps och ger en felaktig dos. Så här gör du:

- Dra ut metallflaskan ur den blå plastbehållaren. Tänk på att metallflaskan inte får läggas i vatten.
- Ta bort locket och spola varmt vatten genom plastbehållaren i 30 sekunder. Vänd behållaren så att vattnet når hela vägen in i munstycket.
- Skaka ur vattnet och låt behållaren torka upp och ner, gärna över natten.
- Sätt tillbaka metallflaskan, var noga med att den sitter rätt.

## Hur vet jag när Airomir Inhalationsspray är tom?

När du inte kan känna någon vätska när du skakar den lätt, eller om det inte kommer någon puff när du testar att trycka av en dos i luften, då är den tom.


### Skötselråd

- Rengör inhalationssprayen minst en gång i veckan.
- Använd före utgångsdatumet på förpackningen.
- Förvaras vid högst 30°C.
- Undvik hög värme som direkt solljus.
- Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller gammal medicin lämnas till apotek för omhändertagande.
- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

# Så här använder du Airomir Inhalationspray



1



Ta av locket och skaka inhalationssprayen kraftigt.

2

Andas ut varsamt, slut sedan läpparna tätt kring munstycket och andas in sakt men kraftfullt samtidigt som du trycker ner metallflaskan på inhalationssprayens ovansida. Håll andan i 5–10 sekunder, andas sedan ut långsamt.



Tryck ut 2 puffar i luften om det är första gången du använder inhalationssprayen eller om det gått minst 2 veckor sedan sist.

Om du ska ta fler inhalationer: Upprepa samtliga steg.

För mer information,  
läs bipacksedeln i  
förpackningen eller  
på [www.fass.se](http://www.fass.se)

Scanna QR-kod för instruktionsfilm på hur du använder Airomir Spray



Airomir® (salbutamol) Inhalationsspray. Receptbelagt läkemedel. **Användning:** Airomir används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Observera att läkemedlet i första hand skall användas för att lindra akuta besvär. **Varningar och försiktighet:** Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Airomir försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. **Läs bipacksedeln noga.** Airomir tillhandahålls av Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg. Maj 2022

**Teva Sweden AB**

Kungstorget 8 | Box 1070 | 251 10 Helsingborg  
Tel 042 12 11 00 | [www.teva.se](http://www.teva.se) | [info@teva.se](mailto:info@teva.se)

